サレド®カプセル、レナリドミドカプセル「FNK」の服用を中止する患者さん及びご家族・パートナーの方へ

服用中止４週間後(　　年　　月　　日)まで
以下を徹底してください

（医療担当者記入欄）

確実な妊娠回避の方法は、性交渉を行わないことです。
性交渉を行う場合は避妊方法※を確認し、必ず実施してください。

A 男性

- 性交渉を行う場合は、必ずコンドームを使用してください。
  女性パートナーも避妊方法※の実施を推奨しています。
  また、妊婦との性交渉はしないでください。
- 精子・精液の提供はしないでください。
- 献血をしないでください。

B 女性

- 献血をしないでください。

C 女性

- 性交渉を行う場合は、１ 種類以上の避妊方法※を実施し、男性パートナーは必ずコンドームを使用してください。
- 服用中止４週間後に妊娠検査が必要です。
  妊娠検査のために来院してください。
- 授乳をしないでください。
- 献血をしないでください。

※避妊方法については、裏面をご確認ください。

医療担当者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

患者さんチェック欄：☐ 上記の説明を理解しました

避妊方法について

サレド®カプセル及びレナリドミドカプセル「FNK」は、お腹の赤ちゃん(胎児)に重大な障害を引き起こす可能性があります。
男性患者さん及び妊娠回避の必要な女性患者さんと男性パートナーの方は、定められた期間中、性交渉を行わないか、避妊を徹底する必要があります。

避妊方法

妊娠回避の必要な女性患者さんと男性パートナーの方は、それぞれ以下の避妊方法のうち 1 種類以上を実施し、男女合わせて 2 種類以上を組み合わせてください。
男性患者さんは必ずコンドームを使用してください。
また、効果的な妊娠回避を行うため、女性パートナーの方にも以下の避妊方法の実施が推奨されています。

男性の避妊方法	女性の避妊方法
・ **コンドーム**	・ **経口避妊薬(ピル)** ・ **子宮内避妊具(IUD/IUS)** ・ **卵管結紮術** のうち 1 種類以上の方法を実施する

藤本製薬株式会社
TERMS 管理センター
2026 年 11 月　作成